

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Republice Włoskiej) i krajach trzecich (Kanadzie i USA)

1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych.
2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem.
3. Sprawdzenie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.
4. Niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej.
5. Zgłaszanie w powiatowym inspektoracie weterynarii zamiaru przywozu drobiu, w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem.
6. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.
7. Rozważenie wyłożenia na stałe mat dezynfekcyjnych, jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.